

53^e Edition

DICTIONNAIRE VIDAL

1977

Tous droits de reproduction, addition
et supplément réservés à l'Éditeur.

O. V. P.

11, rue Quentin-Bauchart, 75008 PARIS

(1) 723-80-81 (jonctions multiples)



BACITRACINE 500 U. NÉOMYCINE 3,5 mg/g MONOT

FORME et PRÉSENTATION :

Pommade : Tube de 15 g.

COMPOSITION :

par conditionnement

Bacitracine 7.500 U. l.
Néomycine base 0,0525 g
(sous forme de sulfate)

Excipient : huile de vaseline, vaseline, c. s.

PROPRIÉTÉS :

Association de deux antibiotiques à spectre bactérien très large : active dans les affections cutanées, O.R.L., ophtalmiques à germes Gram + et Gram -

INDICATIONS :

- Pyodermites, impétigo, eczémas infectés, furoncles, anthrax, plaies et brûlures infectées, panaris.
- Infections nasales et de l'oreille externe.
- Conjonctivites, ulcères de la cornée, kératites.

MODE D'EMPLOI et POSOLOGIE :

Appliquer une large couche de pommade sur la lésion, 2 fois par jour.

VISA : D, TR 0681 - Commercialisé depuis 1956.

PRIX : 5,35 F.

Remb. Séc. Soc. à 70 %.

Laboratoires MONOT

21800 QUETIGNY - (Tél. : (80) 30-90-00)

BACTÉRIOPHAGES

BACTÉ-COLI-PHAGE :

FORME et PRÉSENTATION :

Ampoules buvables de 5 ml : Boîte de 30.

COMPOSITION : Par ampoule : 5 milliards de bactériophages sélectionnés et adaptés pour détruire par lyse diverses variétés de *Coli* pathogènes.

PROPRIÉTÉ : Lyse des *Coli* pathogènes.

INDICATIONS :

- Colibacillose urinaire.
- Colibacilloses diverses.

POSOLOGIE :

- Colibacillose urinaire :

- Voie orale : 2 ampoules diluées dans de l'eau 3 fois par jour.
- Voie locale : chaque jour, 2 ampoules diluées dans 50 cm³ d'eau bouillie, soit en instillation intravésicale, soit en lavement à garder.

- Colibacilloses diverses :

- a) Affections du tube digestif et gastro-entérites infantiles : en association avec le Bacté-Intesti-Phage : une ampoule de chaque, diluée dans de l'eau alcaline, 3 fois par jour.
- b) Affections de l'appareil génital : en association avec le Bacté-Pyo-Phage : une ampoule de chaque, diluée dans de l'eau, 3 fois par jour.

VISA : 22 SV 1.27 - Commercialisé depuis 1928.

PRIX : 12,80 F.

Remb. Séc. Soc. à 70 % - Collect. et A. P.

BACTÉ-INTESTI-PHAGE :

FORME et PRÉSENTATION :

Ampoules buvables de 5 ml : Boîte de 30.

COMPOSITION : Par ampoule : 5 milliards de bactériophages actifs sur : *B. Dysentériques*, *B. Typhiques* et *Para. I.* *Coli* pathogènes, *Entérocoques*, *Streptocoques*, *Staphylocoques*, *B. Pyocyaniques*, *B. Proteus*.

PROPRIÉTÉ : Lyse des principales bactéries pathogènes de l'intestin.

INDICATIONS :

- Maladies intestinales de l'adulte et de l'enfant : diarrhées, entérites, gastro-entérites, colites, entérocolites.
- En association avec les antibiotiques per os :
 - Renforce l'action bactériostatique de l'antibiotique et détruit les souches résistantes.
 - Aide au réamorçage de la flore intestinale utile perturbée par l'antibiotique.
 - Oppose des phages spécifiquement actifs sur des microbes intestinaux (*staphylo*, *proteus*, etc.) devenus pathogènes par leur multiplication dans l'espace libre créé par l'antibiotique.

POSOLOGIE :

- Voie orale : 2 ampoules diluées dans de l'eau alcaline, 3 fois par jour.
- Voie rectale : 2 ampoules diluées dans 50 cm³ d'eau bouillie.

VISA : 22 SV 1.022 - Commercialisé depuis 1928.

PRIX : 12,80 F.

Remb. Séc. Soc. à 70 % - Collect. et A. P.

BACTÉ-PYO-PHAGE :**FORME et PRÉSENTATION :**

Ampoules buvables de 5 ml : Boîte de 30.

COMPOSITION : Par ampoule : 5 milliards de bactériophages actifs sur : Staphylocoques, Streptocoques, Entérocoques, Coll. Pyrocyaniques, Proteus.

PROPRIÉTÉ : Lyse des principales bactéries pyogènes.

INDICATIONS : Plaies, brûlures infectées, abcès, impétigo, acné, folliculite, métrites, salpingites, affections urinaires à Proteus.

POSOLOGIE :

- Voie orale : 2 ampoules diluées dans 1/2 verre d'eau alcaline 3 fois par jour.
- Voie locale : pansements imbibés de Pyo-phage. Instillations *in situ* et ponctions-instillations (méthode du Dr Raigel).

VISA : 22 SV 1.023 - Commercialisé depuis 1928.

PRIX : 12,80 F.

Remb. Séc. Soc. à 70 % - Collect. et A. P.

BACTÉ-STAPHY-PHAGE :**FORME et PRÉSENTATION :**

Ampoules buvables de 5 ml : Boîte de 30.

COMPOSITION : Par ampoule : 5 milliards de bactériophages sélectionnés et adaptés pour détruire par lyse diverses formes de staphylocoques (dorés, citrins, blancs).

PROPRIÉTÉ : Lyse des principales formes de staphylocoques.

INDICATIONS : Toutes infections à staphylocoques : furoncles, abcès, anthrax, panaris, ostéomyélite, infections urinaires.

POSOLOGIE :

- Voie orale : 2 ampoules diluées dans de l'eau alcaline 3 fois par jour.
- Voie locale : pansements imbibés, instillations *in situ* et ponctions-instillations (méthode du Dr Raigel), instillations intravésicales.

VISA : 22 SV 1.025 - Commercialisé depuis 1928.

PRIX : 12,80 F.

Remb. Séc. Soc. à 70 % - Collect. et A. P.

BACTÉ-RHINO-PHAGE**FORME et PRÉSENTATION :**

Ampoules pour pulvérisations nasales et bucco-pharyngées de 4 ml : Boîte de 28.

PROPRIÉTÉ : Lyse des principales bactéries pathogènes de la flore rhino-pharyngée.

INDICATIONS : Rhino-pharyngites, Sinusites, Angines, Coryza, Grippe et complications, Otitis.

MODE D'EMPLOI :

- Pulvérisations nasales et bucco-pharyngées toutes les 3 heures.
- Instillations, gargarismes, aérosols.
- Mèches imbibées (otites).

VISA : 22 SV 1.024 - Commercialisé depuis 1928.

PRIX : 12,10 F.

Remb. Séc. Soc. à 70 % - Collect. et A. P.

Laboratoires du BACTÉRIOPHAGE

Fondé par le Professeur d'HÉRELLE

75, rue Olivier-de-Serres - 75015 PARIS

(Tél. : 828-55-82)

BACTISUBTIL®**FORMES et PRÉSENTATIONS :**

- Ampoules buvables de 10 ml : Boîte de 10 et Coffret de 30.
 - Gélules : Boîte de 20.
- Conditionnement hôpitaux : Boîte de 500 ampoules ou gélules.

COMPOSITION :

Culture pure de *Bacillus subtilis* (spores végétatives), souche IP 5832 ; minimum : 1 milliard de germes par gélule, 500 millions par ampoule.

Excipients : Ampoules : chlorure de sodium, eau purifiée.
Gélules : carbonate de calcium, lactine.

SORT DU MÉDICAMENT : Grâce à sa forme sporulée le Bactisubtil échappe à l'action bactéricide du milieu gastrique, de la bile et des ferments digestifs, il développe une activité enzymatique au moment de la germination de la spore dans l'intestin.

PROPRIÉTÉS : Bactériothérapie intestinale.

- action complémentaire de la digestion.
- acidification ménagée du milieu.
- activité lytique directe sur certaines bactéries.
- reconstitution de la flore saprophyte endogène.

INDICATIONS :

- Complément des traitements par les antibiotiques.
- Diarrhées du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte.
- Entérites, colites, colopathies fonctionnelles.
- Intolérance digestive à certains médicaments.

POSOLOGIE :

En raison de son innocuité, le Bactisubtil peut être administré, chez le nourrisson.

- Nourrissons, enfants :

2 à 4 gélules ou ampoules par jour